



KUĆNI LJUBIMCI

KAKO ZAŠTITI KUĆNE LJUBIMCE OD MALIH ZLIH KRVOPJIJA

Zasuni, rešetke, sigurnosne kamere, protuprovalni alarmi, sve su to načini kako se štitimo od ulaza u dom nepoželjnih ljudskih posjetitelja.

No kako da svoj dom zaštитimo od ulaza malih zlih krvopija?

Piše Lea Kreszinger dr. vet. med

Veterinarska klinika Kreszinger; www.klinika-kreszinger.com

Ako imate kućnog ljubimca, već ste sigurno naučili kako ga za šetnji i odlazaka u prirodu zaštiti od nametnika. No, ako imate ljubimca koji nikada ne napušta dom, to ne znači da je potpuno siguran od buha, krpelja i drugih nametnika, jer oni mogu dospjeti u vaš dom preko posjetitelja, drugih kućnih ljubimaca, odjeće i obuće, ali i kroz otvorena vrata i prozore.

Ugriz buhe

Vlasnicima je ponekad potrebno neko vrijeme da primijete češanje ili pojачan gubitak dlake. Često su sigurni kako njihov ljubimac nema buhe jer ih nisu vidjeli. No, ako su mačka ili pas alergični na ugriz buhe, jedna jedina buha dovoljna je da izazove reakciju koja će stvoriti nelagodu koja traje tjednima. No, ponekad ugriz buha može ostati prikriven sve dok se ne pojavе vidljivi zdravstveni

Morate znati da se ne češu se svi kućni ljubimci koji imaju buhe

problemi. Jedan od tih znakova je i izmet buhe, koji se uglavnom sastoji od probavljenje krvi koju sišu. To može izgledati kao komadići mljevenog crnog papra ili prljavštine na koži vašeg ljubimca ili na mjestima gdje spava.

Mali test

Kako biste otkrili o čemu se radi, stavite mrvice na papirnat i ubrus i poprskajte vodom. Ako se otapaju u crvenu masu, to je

potvrda da se radi o izmetu buhe. Izmetom se hrane larve buha kad se izlegu iz jajašaca. To se događa tek u povoljnim uvjetima, što znači da se jajašca u okolišu (tepići, parket, namještaj) mogu zadržati dosta dugo.

Ne češu se svi kućni ljubimci koji imaju buhe. Ako se vaš ljubimac naučio pretjerano dotjerivati (izlati), može ukloniti sve tragove buha prije





Jedan od načina zaštite
je kapanje preparata u
obliku ampula



nego što ih imate priliku uočiti. Te krvopije znaju se vrlo dobro sakriti, a u međuvremenu dlaka vašeg ljubimca mijenja kvalitetu, javljaju se krastice od sve više češkanja te sve opsežnije promjene po koži.

Alergije

To su obično pokazatelji alergijskog dermatitisa uzrokovanih ugrizom buhe (tzv. flea allergy dermatitis, FAD). Slične simptome uzrokuju i druge vrste alergija. Posavjetujte se s veterinarom i on će vam ponuditi čitav spektar preparata, od onih koji ubijaju buhe, sprečavaju ženke da polažu jajašca, koji istovremeno ubijaju ušnu šugu, krpelje, gliste, srčane crve, demodekse do onih koji odbijaju komarce i papatače. Preparati se razlikuju i prema načinu aplikacije, od onih koji se stavljuju kao ogrlice ili kapaju u obliku ampula do onih koji se kao poslastica jednostavno pojedu.

I za kraj, ali ne najmanje važno, buha prelazi sa životinje na čovjeka, naročito kod jakih infestacija, i prijenosnik je nekoliko vrsta trakavica, stoga je izvor zaraze i za ljudi i za životinje.



► Strogo zatvorene mačke mogu dobiti buhe.

► Ako vaš ljubimac nije alergičan na slinu buhe, ne mora se nužno češati.

► Neki se ljubimci u početku ližu u nastojanju da uklone izvor svraba.

► Iz jajašaca se razvijaju ličinke i na kraju buhe koje počinju hranjenje na vašem ljubimcu. Odrasle buhe ponovno liježu jajašca i tako ukrupnjuju. Buha živi samo nekoliko mjeseci, ali u to vrijeme ženka buhe može položiti 500 ili više jajašaca.

► Zaraza buhamu može

se pretvoriti u ozbiljan problem ako se brzo i učinkovito ne tretira, posebice kod mačića, štenadi ili alergičnih ljubimaca. Neližećena zaraza može dovesti do anemije, za život opasne situacije za vašeg kućnog ljubimca.

► Najvažnije je tretiranje, tj. uklanjanje buha i njihovih razvojnih stadija iz okoliša u kojem životinja boravi te sprečavanje ponovne zaraze.

